

<b>PZN: 00089537</b>	<b>Datum: 15.06.2020</b>
<b>Produktname: Prelox®</b>	<b>Name und Anschrift des Unternehmens:  Pharma Nord GmbH Schiffbrückstr. 6 24937 Flensburg</b>

Status:

- Nahrungsergänzungsmittel     Lebensmittel     diätetisches Lebensmittel  
 \_\_\_\_\_

Zutaten:

L-Argininaspartat, Füllmittel: Mikrokristalline Cellulose/Siliciumdioxid, Mikrokristalline Cellulose, Taurin, Trennmittel: Siliciumdioxid, Glyceryldibehenate, französischer Meereskiefernextrakt (Pycnogenol®), Trennmittel: Croscarmellose-Natrium, Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose, Polydextrose, Talkum, Maltodextrin, Mittelkettige Triglyceride, Farbstoff: Titandioxid, Brillantblau FCE, Indigokarmin, Allurarot AC

Zusammensetzung:

	Pro Tagesportion <u>2 Tabletten</u>	Pro Tagesportion <u>4 Tabletten</u>	Pro <u>100 g</u>
L-Argininaspartat	1400 mg	2800 mg	66,7 g
Taurin	100 mg	200 mg	4,8 g
Pycnogenol (Meereskiefernextrakt)	40 mg	80 mg	1,89 g

Hinweis für Diabetiker: 1 Tagesportion von 4 Tabletten enthält 0 BE.

Nährwerte:

<b><i>Nährwerte pro Einheit</i></b>	
<i>Energie</i>	15,0 KJ
<i>Fett</i>	30 mg
<i>- davon gesättigte Fettsäuren</i>	
<i>Kohlenhydrate</i>	290 mg
<i>- davon Zucker</i>	
<i>- mehrwertige Alkohole</i>	
<i>Eiweiß</i>	690 mg
<i>Salz</i>	

Aufbewahrungsbedingung und ggf. Verwendungsbedingung nach dem Öffnen:

Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.

Nettofüllmenge/Stückzahl/Abtropfgewicht:

Inhalt: 60 Tabletten = 63 g

Gebrauchsanleitung, Zubereitungshinweis, sonstige Hinweise:

Soweit nicht anders empfohlen nehmen Erwachsene 2 Tabletten zweimal täglich während der ersten 2 Wochen und danach zweimal täglich 1 Tablette, unzerkaut zu einer Mahlzeit mit etwas Flüssigkeit ein.

Bei Prelox® handelt es sich um eine ergänzende bilanzierte Diät, nicht um ein vollständiges Lebensmittel.

Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung sowie und gesunde Lebensweise.

Prelox® darf nur von Erwachsenen und unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden.

Allurarot: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.